
EL HORNERO

REVISTA DE ORNITOLOGÍA NEOTROPICAL



Establecida en 1917
ISSN 0073-3407

Publicada por Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata
Buenos Aires, Argentina

Observaciones de aves poco comunes en La Pampa

Williamson, J.

1971

Cita: Williamson, J. (1971) Observaciones de aves poco comunes en La Pampa. *Hornero* 011 (02) : 124b-124

www.digital.bl.fcen.uba.ar

Puesto en línea por la Biblioteca Digital de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

NOTAS GENERALES

NIDIFICACION DEL HALCONCITO GRIS

(*Spizapteryx circumcinctus*)

EN LA PAMPA Y RIO NEGRO

Se considera interesante informar sobre dos casos de nidificación del llamado Halconcito gris (*Spizapteryx circumcinctus*), el primero en la Provincia de la Pampa y el segundo en la Provincia de Río Negro que, según la opinión del Dr. Dean Amadon del Museo Americano de Historia Natural, son los primeros registros autenticados hasta la fecha.

El primer caso corresponde a La Pampa. En diciembre del año 1944, en un monte de caldénes (*Prosopis nigra*), cerca de la localidad de Conchello, encontré un nido abandonado de *Pseudoseisura lophotes* ocupado por tres pichones de este halconcito. El nido se encontraba a unos 6 metros del suelo sobre una robusta rama de calden; un costado había sido aplastado formando una plataforma techada que servía de nido. Los tres pichones estaban bastante crecidos y se pusieron de espalda cuando subí a observarlos. Los padres se mantenían bien cerca, emitiendo ese grito característico, medio gemido, medio silbido.

El segundo caso corresponde al monte de arbustos bajos al sud del Río Colorado, cerca de la estación Juan de Garay del Ferrocarril General Roca, en territorio de la Provincia de Río Negro. En este caso, el nido ocupado también era de *P. Lophotes*, ubicado bien en el centro de un arbusto de Chañar (*Gourliea decorticans*). El costado del viejo nido también había sido aplastado y en una pequeña hondura de la plataforma así formada, había tres huevos, colocados sobre los palitos, sin material de relleno. Uno de los padres estaba echado y dejó el nido únicamente cuando lo toque con un palo. Los huevos resultaron bastante incubados, pero aun así fue posible prepararlos. Tenían fondo amarillo algo cremoso, casi cubierto por pequeñas pecas marrón tirando a rojizo. Las medidas son de 41 x 30,8; 40,6 x 31,4 y 37,6 x 31,7, y se encuentran actualmente en el Museo Británico de Historia Natural de Londres.

Alejandro Dean, agosto 1970

OBSERVACIONES DE AVES POCO COMUNES EN LA PAMPA

Durante fines del invierno y principios de la primavera del año 1969, ha sido observada la presencia de una pareja de Rey del bosque (*Pheucticus aureoventris*), en el parque de un campo de la localidad de Ojeda, FCNDFS, Provincia de La Pampa. Es la primera vez que hemos visto a esta especie en estos lugares.

En la tardecita del día 6 de septiembre de 1970, tuvimos el gusto de ver a un ejemplar del Picaflor coludo (*Sappho sparganura*), fácil de distinguir por sus colores y forma de la cola. No sabemos cuanto habrá estado en la zona, pues no hemos tenido oportunidad de verlo nuevamente. El ejemplar citado visitaba las flores de *Nicotiana glauca*, var. *laterita*, variedad de flores rojas de "Palán-palan", que florece casi todo el año.

Juan Williamson

General Pico, La Pampa